

استعمال کرنے سے قبل برائے مریض یا ماحول کے لیے پڑھیں۔

READ LEAFLET BEFORE USE. उपयोग سے پہلے संलग्न लीफलेट पढ़ें।

Hitweed Pyriithobac Sodium 10 % EC Selective Herbicide

Chemical Composition : Content % w/w:Pyriithobac sodium a.i. :10.0%w/w, Demineralized Aqua :QS%w/w, Ethoxylated mixture of Lauryl alcohol and octyl phenol Emulsifier : 25.00%w/w, **Total:100.00%w/w. Crops and Pest Groups:** Pyriithobac Sodium 10 % EC is a Herbicide used for the control of weeds (As given in leaflet table) in cotton crop. **Dosage, Direction for use and Manner and time of application :** Please refer leaflet for details. **Purpose:** For agricultural use. **Re-entry:** 24 hours after spraying. **Safety Precautions:** keep away from food and feedstuff. avoid contact with skin and eyes. avoid inhalation of the spray mist. wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. wear full protective clothing while spraying. **Symptom of Poisoning:**Eyes and skin irritation may occur. on contact redness in eyes, tearing may occur. nasal irritation, respiratory distress, tremors and in-coordination may also occur. **First Aid:** Please refer leaflet for details. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **Cautionary statements:** Not to be used on crops other than mentioned on this label/leaflets. Not to be used for post-harvest applications. Destroy the container after use as directed on leaflet. 1. Intoxicated for fish and other aquatic animals. Therefore, aquaculture should not be used for driving. 2. Discontinued for bees. Therefore, active foraging of bees should not be used during more and more use.

हिटवीड पायरिथायोबेक सोडियम १०% ई.सी. चयनात्मक खरपतवारनाशक

रासायनिक संरचना: मात्रा : पायरिथायोबेक सोडियम स.त. :१०.००% भा./भा.,आखनिज जल : आवश्यकतानुसार,लरिल एल्कोहल व ओक्टिल फिनोल इथोक्सिलेट के मिश्रण इमल्सीफायर: २५.००% भा./भा., योग: १००.००%भा./भा.। **फसलें और नाशक जीव समूह:** पायरिथायोबेक सोडियम १०%ईसी कपास की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले एक हर्बिसाइड है (जैसा कि पत्रक में दिया गया है)।**मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश और रीति और अनुप्रयोग का समय :** कृपया विवरण के लिए पत्रक का संदर्भ लें। **प्रयोजन :** कृषि उपयोग के लिए । **पुनः प्रविष्टि :** छिड़काव के २४ घंटे बाद। **सुरक्षा पूर्वाधानियाँ :** खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचायें। प्रयोग करते समय साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में प्रयोग न करें। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। प्रयोग के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ खबाना नहीं चाहिए। इस्तेमाल के समय चश्मा, दस्ताने व अन्य सुरक्षा कवच पहनें। **विषावसीकरण के लक्षण :** पदार्थ के संपर्क में आने पर त्वचा में जलन, खुजली,ललाई, सुजन व आँखों में जलन आँसू आना आदि हो सकता है। नाक में खुजली, साँस की तकलीफ, कंपकंपी व लड़खड़ाता आदि विष के लक्षण हो सकते हैं। **प्राथमिक उपचार :** कृपया विवरण के लिए पत्रक का संदर्भ लें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **सावधानियाँ कथन :-**प्रयोग केवल इस पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर न करें। फसल – कटाई के उपरांत अनुप्रयोग हेतु उपयोगी नहीं। –पत्रक के उपयोग के बाद कंटेनर को नष्ट कर दें। १. मछली और अन्य जलीय जीवों के लिए विषाक्त। इसलिए,एक्वाकल्चर के पास इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। २. मधुमक्खियों के लिए विषाक्त। इसलिए मधुमक्खियों के सक्रिय फोर्निंग अवधि के दौरान उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **निर्माता और विपणनकर्ता: गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस:** गोदरेज वन, तीसरी मंजिल, पिरोजशाह नगर, इस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली (१), मुंबई – ४०० ०७९, महाराष्ट्र , इंडिया। उत्पादन परिसर : लेन नं.७, इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, साम्ब, जम्मू-१८४१२१, जम्मू/एन्ड कश्मीर, भारत।

هٹ ویڈ پائریتھایوبیک سوڈیم 10% ای سی منتخب نباتات کش دوا

کیمیائی ترکیب: اجزاء : پائیریتھوبیو بیک سوڈیم: ۱۰.00 % وزن/وزن, دیگر منرلز کے پانی: کوہاس % وزن/وزن, لاریل الکوحل اور اوکٹائیل فینول کا ایٹھاکسیلیٹ مرکب. ایٹسیفائر (شیرہ ساز): 25.00 % وزن/وزن, کل میزان: 100.00 % وزن/وزن, فصل اور کیڑے گروپ: پائیریتھوبیو بیک سوڈیم 10 % ای.سی.ایک گھاس پھوس کش ہے جو کہ کہاس کے فصل میں گھاس پھوس کو کنٹرول کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے(جیسا کہ پرچی کے ٹیبل میں دیا گیا ہے).رونی کے فصل میں. خوراک, استعمال کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ اور وقت: میر ہانی کرکے تفصیلات کیلئے پر چی دیکھیں. مقصد: ایگریکلچر استعمال کیلئے. دوبارہ داخلہ: چھڑکاؤ کے چوبیس گھنٹے بعد. حفاظتی تدابیر: غذا اور غذائی اجناس سے دور رکھیں. جلد اور آنکھوں پر لگنے نہ دیں. چھڑکاؤ کا پھوار سانس کے ساتھ نہ لیں.چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کیڑے اور جسم خوب دھوئیں.چھڑ کاؤ کے دوران تمباکو نوشی,کھانے ,پینے اور کوئی چیز چبانے سے پرہیز کریں.چھڑ کاؤ کے دوران مکمل حفاظتی کیڑے استعمال کریں. زیر کے زیر اثر ہونے کی علا مات:-آنکھوں اور جلد میں خارش,آنکھوں میں سرخی یا خون بہنا,ناک میں خارش,تنفسی بیگاڑ,بین کا کھینا اور عدم توازن. ابتدائی امداد: میر ہانی کرکے تفصیلات کیلئے پرچی دیکھیں. تریاق: کوئی خاص تریاق دستیاب نہیں ہے.علامات کے مطابق علاج کریں. احتیاطی بیان: لیبل/پرچی میں دینے گئے فصلوں کے علاوہ کسی بھی فصل پر استعمال نہ کریں.فصل کٹائی کے بعد استعمال نہ کریں.پرچی میں دینے گئے طریقے پر کنٹینر کو استعمال کے بعد ضائع کریں. 1حیچلیوں اور دیگر پانی میں رہنے والے جانداروں کے لئے زہریلی ہے. اس لئے زرعی زراعت کے نزدیک استعمال نہ کریں. 2شہد کی مکھیوں پر نہ چھڑکیں.اس لئے جب شہد کی مکھیاں فصل پر موجود ہوں اس وقت استعمال نہ کریں.

تیار کردہ اور فروخت کردہ: **گودریج ایگروویٹ لمیٹید, رستہ ڈاکس: گودریج وین, تیسری منزل, پروڈیگٹر, انڈران, کیرپس پانیے, مرکزی (شرقی) -پٹن- ۷۰۰۰۰۰, مہاراشٹر, بھارتی: پٹن نمبر ۷, انڈسٹریل گروٹھ سینٹر, سامبا, جموں- ۱۸۳۱۲۱, جموں و کشمیر, انڈیا۔**



1 L / ۱ لیٹر

Manufactured and Marketed by : **Godrej Agrovet Limited,** Regd. Office : Godrej One, 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai-400079, Maharashtra, India. Manufacturing Premises : Lane No, 7, Indl. Growth Centre, Samba, Jammu-184121, J&K, India.

In case of complaints, please contact our customer service executive at the Registered Office address of the Manufacturer and Marketer or email at gavlho@godrejagrovvet.com or call us at 022 –2519 4491.

Keep Out Of Reach Of Children

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

DANGER
खतरा

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

Net Content
शुद्ध मात्रा

1 L

Regn. No./रजि नं.: CIR-586/2006(261)-Pyriithobac Sodium (EC)-4

Mfg. Lic. No. /उ.ला. नं.: J/M-Pvt/25

Batch No./बैच नं.:

Mfg.Date/निर्माण तिथि:

Expiry Date/अन्तिम तिथि:

51mm x 35 mm

Max. Retail Price : ₹
(Inclusive of all taxes)/
अधिकतम खुदरा मूल्य रु. (सभी करों सहित)



Godrej agrovet

SIZE : 277 mm (W) x 155 mm (H)

PDP : 171 Sq.cm = 2.5 mm